ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ИММУНИЗАЦИИ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ *(ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)*

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ БЛАГОПОЛУЧИИ НАСЕЛЕНИЯ» №52 ФЗ

- ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» №157ФЗ

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 декабря 2021 г. N 1122н
- «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК»

- САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ» - раздел XLVI. Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней

- ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21.03.2003 г. № 109
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКЕУЛЕЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

- ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (от 21 января 2022 г. N 15-2/И/2-806) «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 1122Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ И ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК»

- МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РАССЛЕДОВАНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ПОБОЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПОСЛЕ ИММУНИЗАЦИИ» (2019г.)

- Инструкции по применению лекарственных иммунобиологических препаратов, используемых для специфической профилактики инфекционных заболеваний

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ОТВЕЧАЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

НАЗНАЧАЕТ:

- *Д.Л., ответственных за все разделы формы работы по организации и проведению иммунизации, в том числе за проведение планирования прививок и контроль за выполнением плана иммунизации.*
- *Д.Л., ответственных за обращение с медицинскими отходами, образующимися при проведении иммунизации.*

УТВЕРЖДАЕТ:

- *ПЛАН мероприятий по реализации «холодовой цепи» при транспортировании и хранении лекарственных иммунобиологических препаратов.*
- *ПЛАН повышения уровня знаний медицинских работников по вопросам проведения иммунопрофилактики, в том числе – планированию профилактических прививок.*

УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):

- **Документация о переписи детей по домам и годам рождения - по каждому участку медицинской организации; сводные данные переписи детей по участкам, отделениям и в целом по МО**

- **Списки детей, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (по группам или классам)**

- **Картотека учетных прививочных форм:**
- **по участкам - на детей, проживающих на территории обслуживания МО неорганизованных и организованных, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации на территории других медицинских организаций;**
- **по организациям – на организованных детей, посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации на территории обслуживания МО.**

- **Журнал миграции населения**

- **Журнал учета новорожденных**

- **Журнал работы иммунологической комиссии**

- **Журнал учета длительных медицинских отводов от профилактических прививок (по участкам, отделениям и организациям)**

- **Списки детей, родители которых отказались от профилактических прививок детям (по участкам, отделениям и организациям)**

- **Журнал приема пациентов в прививочном кабинете**

УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):

- Картотека учетных прививочных форм на неработающее население (по участкам, отделениям)
- Перечень объектов, где организуются профилактические прививки, расположенные на территории обслуживания МО (по участкам, отделениям)
- Списки работающих по каждому объекту со сведениями о профилактических прививках; (картотека учетных прививочных форм) и медицинских отводах (отказах) от прививок
- Журнал учета длительных медицинских отводов от профилактических прививок (по участкам и организациям)
- Списки лиц, отказавшихся от профилактических прививок (по участкам и организациям)
- Журнал работы иммунологической комиссии
- Журнал приема пациентов в прививочном кабинете.

УЧЕТНО-ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ИММУНИЗАЦИЮ (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):

- Ежемесячные отчеты о выполнении плана профилактических прививках по участкам отделениям, организациям;
- Форма 5 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о профилактических прививках»;
- Форма 6 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний».

ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

ВЕДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НА УРОВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ СУБЪЕКТА РФ (ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ) - ПОЗВОЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ:

- полноту учета населения, подлежащего иммунизации;
- ведение электронных карт профилактических прививок (форма 63/у);
- сохранность данных об иммунизации:

*при перемене места жительства, учебы, работы,

*при переводе подростка из МО, обслуживающей детское население в МО, обслуживающее взрослых;

- доступность информации об иммунизации граждан для всех заинтересованных МО

<u>* объективное проведение планирования прививок, в том числе формирование персонифицированных планов прививок организованного и/или неорганизованного детского населения, работающего и/или не работающего взрослого населения</u>

*достоверность отчетности о проведенных профилактических прививках (форма 5) и сведений о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний (форма 6)

ДАННЫЕ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИВИВОК:

Демографические показатели:

- перепись населения,
- планируемое число новорожденных (средний показатель рождаемости за последние 3 года),
- средний показатель количества учтенных в МО беженцев/мигрантов/ переселенцев, без сведений о прививках за последние три года.

Данные иммунной структуры:

- данные индивидуальных учетных форм и медицинских документов, содержащие сведения:

*о полученных прививках,

*о перенесенных заболеваниях;

- сведения о лицах, имеющих противопоказания к проведению иммунизации;
- сведения о лицах, имеющих иммунитет к инфекционным болезням НКПП (по данным серологических исследований).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
в соответствии с приложением №1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06 декабря 2021 г. № 1122н

Возраст / Инфекции	ДЕТИ															ВЗРОСЛЫЕ				
	МЕСЯЦЫ										ГОДЫ					ГОДЫ				
	0	1	2	3	4,5	6	12	15	18	20	6	7	12	14	15-17	18-25	26-35	36-55	56-59	60+
Туберкулез	3-7 д.										RV									
Гепатит В	V1	V2				V3														
	V1	V2	V3				V4													
Пневмококковая инфекция			V1		V2			RV												
Коклюш				V1	V2	V3			RV1		АДС-м RV2			АДС-м RV3		Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации (АДС-м)				
Дифтерия																				
Столбняк																				
Полиомиелит				V1 ИПВ	V2 ИПВ	V3 ИПВ			RV1 ИПВ	RV2 ОПВ	RV3 ОПВ									
										RV2 ИПВ	RV3 ИПВ									
Гемофильная инфекция				V1	V2	V3			RV											
Корь							V1				RV									
Краснуха																Женщины				
Эпидемический паротит																				
Грипп						ЕЖЕГОДНО														

V1, V2, V3 - Порядковый номер вакцинации
RV1, RV2, RV3 - Порядковый номер ревакцинации

ИПВ - Инактивированная полиомиелитная вакцина
ОПВ - Оральная полиомиелитная вакцина
АДС-м - Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигенов

Всем лицам

Лицам из групп риска, по показаниям, призывникам (грипп)

Ранее не привитым, не болевшим, не имеющим сведений и однократно привитым (для кори и краснухи)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВИВКАМ:

- **А) лица прививочного декретированного возраста;**
- **Б) лица междекретированного возраста, не привитые ранее в соответствии с НКПП или с неизвестным прививочным анамнезом;**
- **В) переболевшие*;**
- **Г) лица, имеющие противопоказания против иммунизации;**
- **Д) лица, имеющих иммунитет к инфекционным болезням, НКПП по данным серологических исследований.**

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВИВКАМ:

А+Б – (В*+Г+Д)

ПРИМЕЧАНИЕ:

***Не во всех случаях переболевшие прививаемой инфекцией не включаются в план:**

- ***не прививаются*** *переболевшие коклюшем, корью, паротитом, гепатитом В, туберкулезом;*

- **прививаются** по календарю: переболевшие дифтерией и краснухой (не подтвержденные лабораторно случаи), переболевшие полиомиелитом – прививаются инактивированной вакциной.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОДЛЕЖАЩИХ ПЛАНОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ:

- **взрослых, отказавшихся от профилактических прививок и детей, законные представители которых отказались от проведения иммунизации**;

- детей и взрослых имеющих **медицинские отводы**, за исключением лиц, имеющих истинные противопоказания к введению соответствующего иммунобиологического лекарственного препарата;

- не привитых или не имеющих сведений о прививках **детей и взрослых – мигрантов, беженцев и других труднодоступных для иммунизации групп населения** ***(лица, не имеющие медицинского полиса (ОМС или ДМС))***.

(!) Порядок их иммунизации с достижением максимального охвата в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок - должен быть определен на уровне субъекта РФ.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Новорожденные в первые 24 часа жизни	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Дети 1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
Дети 2 месяца	Третья вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска*)
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против вирусного гепатита В
Дети 12 месяцев	Четвертая вакцинация против вирусного гепатита В (группы риска*)
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее против вирусного гепатита В	Вакцинация против вирусного гепатита В

В план вакцинации включаются:

- ***новорожденные*** (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 50% новорожденных;
- ***дети до 6 месяцев 29 дней***;
- **не болевшие, ранее не привитые против гепатита В, с неизвестным прививочным анамнезом:**
- ***дети с 7-ми месяцев до 17 лет 11 месяцев 29 дней,***
- ***взрослые с 18 до 55 лет;***
- ***медицинские работники – без ограничения возраста***.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *К **группам риска** относятся: дети, родившиеся от матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами).*

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Новорожденные на 3 - 7 день жизни	**Вакцинация против туберкулеза**
Дети 6 - 7 лет	**Ревакцинация против туберкулеза**

В план первичной вакцинации включаются:

- новорожденные (среднегодовое за последние 3 года), *за исключением детей с постоянным медицинским отводом*: ВИЧ-инфицированные дети; дети с иммунодефицитными состояниями, злокачественными новообразованиями; дети из семей, где у братьев и сестер (у сиблингов) развилась генерализованная БЦЖ-инфекция.*

В план повторной вакцинации включается:

*среднегодовое количество туберкулиноотрицательных детей, без поствакцинального кожного знака или с поствакцинальным рубцом малых размеров (1 - 2 мм) **через 2 года после вакцинации**, *за исключением:*

**детей с постоянными медицинскими отводами*,*

**детей, перенесших туберкулез.*

В план ревакцинации против туберкулеза включаются:

* **дети в возрасте 6 лет** - среднегодовое число детей имеющих отрицательную реакцию на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л в возрасте 4-х-6-ти лет (за период три года) за исключением *детей, перенесших туберкулез и детей с постоянными медицинскими отводами*;

***дети в возрасте 7 лет** - среднегодовое число детей имеющих отрицательную реакцию на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л в возрасте 5-ти - 7-ми лет (за период три года) *за исключением детей, перенесших туберкулез, детей с постоянными медицинскими отводами и получивших первую ревакцинацию против туберкулеза в 6 лет.*

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 2 месяца	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции
Дети 15 месяцев	Ревакцинация против пневмококковой инфекции

В план вакцинации включаются:

- *новорожденные* (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 70% новорожденных;
- *дети до 6 месяцев 29 дней*;
- дети, иммунизация которых начата позднее сроков проведения прививок, регламентированных НКПП:

* в возрасте с 7-ми месяцев до 12 месяцев - вакцинируются двукратно с интервалом не менее 4 недель между прививками с последующим проведением ревакцинации;
* в возрасте с 13 месяцев - до 1 года мес. 29 дней - прививаются 2-х кратно с минимальным интервалом 8 недель.
* дети с 2 лет и старше – прививаются однократно.

В план ревакцинации включаются:

- дети в 15 месяцев, получившие курс вакцинации в возрасте до 6 месяцев,
- дети, получившие вакцинацию в возрасте с 7 месяцев до 12 месяцев – ревакцинация проводится через 4-6 месяцев после последней прививки курса вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОКЛЮША

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против коклюша
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против коклюша
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против коклюша
Дети 18 месяцев	Ревакцинация против коклюша

В план вакцинации включаются:

- *новорожденные* (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 50% новорожденных;
- дети с 3-х до 6-ти месяцев;
- дети с 7-ми месяцев - ранее не вакцинированные трехкратно, или не ревакцинированные, или не болевшие коклюшем, или с неизвестным прививочным анамнезом:

* до 2-х лет 11 месяцев 29 дней - при применении АКДС-вакцины,

* до 3-х лет 11 месяцев 29 дней – при применении ацеллюлярных коклюшных вакцин.

В план ревакцинации включаются:

- дети в возрасте с 18 месяцев;
- дети с 19 месяцев, получившие законченный курс вакцинации против коклюша (3 прививки) иммунизация которых начата не в сроки НКПП:

* до 3-х лет 11 месяцев 29 дней - при применении АКДС-вакцины,

* до 5-х лет 11 месяцев 29 дней – при применении ацеллюлярных коклюшных вакцин.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	**Первая вакцинация против дифтерии и столбняка**
Дети 4,5 месяца	**Вторая вакцинация против дифтерии и столбняка**
Дети 6 месяцев	**Третья вакцинация против дифтерии и столбняка**
Дети 18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии и столбняка
Дети 6 - 7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
Дети 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка

В план вакцинации включаются:

- *новорожденные* (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 50% новорожденных;

- дети с 3-х до 6-ти месяцев 29 дней;

- дети с 7-ми месяцев до 17 лет 11 месяцев 29 дней - ранее не вакцинированные или не ревакцинированные против дифтерии и столбняка или с неизвестным прививочным анамнезом.

- Вакцинацию переболевших дифтерией детей планируют в соответствии с п. 2968-2970 СанПиН 3.3686-21):

заболевание дифтерией любой формы у непривитых детей и подростков расценивается как первая вакцинация, у получивших до заболевания одну прививку - как вторая вакцинация, дальнейшие прививки проводятся согласно национальному календарю профилактических прививок;

детям, привитым против дифтерии (получившим законченную вакцинацию, одну или несколько ревакцинаций) и переболевшим локализованной или распространенной формой без осложнений, иммунизация проводится в сроки, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок;

дети, привитые двукратно или более двух раз и перенесшие тяжелые формы дифтерии, прививаются однократно с учетом возраста и состояния здоровья в соответствии с инструкцией по его применению, но не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания, последующие ревакцинации - согласно национальному календарю профилактических прививок.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии и столбняка
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии и столбняка
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии и столбняка
Дети 18 месяцев	**Первая ревакцинация против дифтерии и столбняка**
Дети 6 - 7 лет	**Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка**
Дети 14 лет	**Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка**

В план ревакцинации первой включаются:

- дети в возрасте с 18 месяцев;
- дети с 19 месяцев до 17 лет 11 месяцев 29 дней, получившие ранее полный вакцинальный комплекс против дифтерии и столбняка,

В план ревакцинации второй включаются:

- дети в возрасте с 6 лет - 7 лет 11 месяцев 29 дней;
- дети с 8 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней, получившие ранее полный вакцинальный комплекс против дифтерии и столбняка и первую ревакцинацию.

В план ревакцинации третьей включаются:

- дети в возрасте с 14 лет 11 месяцев 29 дней;
- с 15 лет до 17 лет 11 месяцев 29 дней, получившие ранее полный вакцинальный комплекс против дифтерии и столбняка, первую и вторую ревакцинации

ПРИМЕЧАНИЕ:

Ревакцинация против дифтерии и столбняка проводится АКДС- вакциной (до 3-х лет включительно) или дифтерийно-столбнячными анатоксинами (АДС – в 4-5 лет, АДС-М – с 6 лет и старше) или другими альтернативными вакцинами, в связи с чем, данные плана по указанным прививкам должны быть одинаковыми:

Ревакцинация 1 дифтерии = Ревакцинации 1 столбняка;
Ревакцинация 2 дифтерии = Ревакцинации 2 столбняка;
Ревакцинация 3 дифтерии = Ревакцинации 3 столбняка.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛЫХ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Взрослые от 18 лет	Вакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

В план вакцинации включаются:

- **лица 18 лет и старше не привитые ранее или с неизвестным прививочным анамнезом;**

- вакцинацию переболевших дифтерией взрослых планируют в соответствии с пп. 2971-2973 СанПиН 3.3686-21):

взрослые, переболевшие локализованной или распространенной формой дифтерии, не подлежат дополнительной прививке против дифтерии, последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет;

взрослые, перенесшие дифтерию из группы риска по летальности (токсическая II, III степени, круп и тяжелые комбинированные формы дифтерии), должны быть привиты двукратно против дифтерии, но не ранее 6 месяцев после перенесенного заболевания, последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет;

взрослые, перенесшие субтоксическую и токсическую дифтерию I степени, дополнительно прививаются по результатам серологического обследования, но не ранее 6 месяцев после перенесенного заболевания, последующие ревакцинации проводятся каждые 10 лет.

В план ревакцинации включаются - **лица с 18 лет и старше, вакцинированные и ревакцинированные ранее. Ревакцинация проводится через 6-9 месяцев после 2-х кратной вакцинации; далее – каждые 10 лет после последней ревакцинации.**

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 18 месяцев	Первая ревакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
Дети 6 лет	Третья ревакцинация против полиомиелита

В план вакцинации включаются:

- *новорожденные* (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 50% новорожденных;
- дети с 3-х до 6-ти месяцев 29 дней;
- дети с 7-ми месяцев до 15 лет 11 месяцев 29 дней – не получившие ранее полный вакцинированный, или не ревакцинированные против полиомиелита, или с неизвестным прививочным анамнезом.

В план ревакцинации первой включаются

получившие законченный вакцинальный комплекс:
- дети в возрасте 18 мес.,
- дети с 19 месяцев до 15 лет 11 мес. 29 дней.

В план ревакцинации второй включаются

получившие законченный вакцинальный комплекс и ревакцинацию первую:
- дети в возрасте 20 мес.,
- дети с 21 месяца до 15 лет 11 мес. 29 дней.

В план ревакцинации третьей включаются

получившие законченный вакцинальный комплекс, ревакцинации первую и вторую дети в возрасте 6-7 лет.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 18 месяцев	Первая ревакцинация против полиомиелита (ИПВ*)
Дети 20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
Дети 6 лет	Третья ревакцинация против полиомиелита

Примечание:

***В соответствии с НКПП - первая, вторая, третья вакцинации и первая ревакцинация против полиомиелита <u>всем детям, не зависимо от возраста начала иммунизации</u>, <u>планируются и проводятся инактивированными полиомиелитными вакцинами</u>.**

Контингенты группы риска, которым все ревакцинации проводятся инактивированной вакциной не зависимо от возраста:

- детям с иммунодефицитными состояниями или анатомическими дефектами, приводящими к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией;
- детям с аномалиями развития кишечника;
- детям с онкологическими заболеваниями и/или длительно получающим иммуносупрессивную терапию;
- детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией;
- недоношенным и маловесным детям;
- детям, находящимся в домах ребенка) - вакциной для профилактики полиомиелита (инактивированной).

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕМОФИЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ТИПА В

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 3 месяца	Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b
Дети 4,5 месяца	Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b
Дети 6 месяцев	Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b
Дети 18 месяцев	Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b

В план вакцинации включается:

- *новорожденные* (среднее значение новорожденных за последние 3 года - расчетное); для законченной вакцинации - 50% новорожденных;
- дети с 3-х до 6-ти месяцев 29 дней;
- дети с 7-ми месяцев до 17 лет 11 месяцев 29 дней, ранее не вакцинированные против гемофильной инфекции.

В план ревакцинации включаются:

- дети первого года жизни, получившие 3 прививки против гемофильной инфекции в предыдущем году (в возрасте до 12 месяцев).

Примечание:

Дети, не получившие прививки в календарные сроки, планируются на вакцинацию и ревакцинацию против гемофильной инфекции ***по следующей схеме:***

- в возрасте от 6 до 12 месяцев - 2 прививки с интервалом в 1 - 1,5 месяца, ревакцинация проводится однократно в 18 месяцев;
- в возрасте от 1 года до 5 лет – вакцинация однократная, ревакцинация *не* проводится.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 12 месяцев	**Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита**
Дети 6 лет	**Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита**
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	**Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи**
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска*	Вакцинация против кори, ревакцинация против кори

В план вакцинации детей против кори, краснухи и эпидемического паротита включаются:

- дети в возрасте 1 год;
- дети с 2 до 17 лет 11 месяцев 29 дней:
- не болевшие корью, краснухой (лабораторно подтвержденные случаи), эпидемическим паротитом;
- *не привитые ранее или с неизвестным прививочным анамнезом.

В план ревакцинации против кори, краснухи и эпидемического паротита детей включаются:

- дети в возрасте 6 лет ранее вакцинированные (минимальный интервал от вакцинации – 6 мес.);
- дети с 7 до 17 лет 11 мес. 29 дней ранее вакцинированные (минимальный интервал от вакцинации – 6 мес.)

В план вакцинации и ревакцинации против краснухи с 18 до 25 лет включаются:

- женщины от 18 до 25 лет (включительно), не привитые, привитые однократно против краснухи или с неизвестным прививочным анамнезом, не имеющие иммунитета к краснухе (IgG) по результатам серологических исследований.

ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ, КРАСНУХИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Дети 6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи	Вакцинация против краснухи, ревакцинация против краснухи
Дети от 1 года до 17 лет (включительно), **взрослые от 18 до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам риска***	**Вакцинация против кори, ревакцинация против кори**

В план вакцинации и ревакцинации взрослых против кори включаются:

лица, не болевшие корью (лабораторно-подтвержденные случаи), ранее не привитые, не имеющие сведений о прививках, не имеющие IgG к кори по результатам серологического обследования:

- возрастной группы с 18 до 35 лет 11 месяцев 29 дней;

- возрастной группы с 36 до 55 лет 11 месяцев 29 дней, относящиеся к группе риска (организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ),

- взрослые без ограничения возраста, относящиеся к группе риска (медицинские работники и работники образовательных учреждений).

Ревакцинация планируется с интервалом от вакцинации - не менее 3-х месяцев.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования; взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы); лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие; беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением	Вакцинация против гриппа

ПРИМЕЧАНИЕ: *Охват профилактическими прививками против гриппа - не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации*

В план вакцинации включаются *не менее 75% от численности лиц, относящихся к группам риска, определенных НКПП:*

- дети с 6 месяцев, учащиеся 1 - 11 классов;
- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы);
- лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров; государственные гражданские и муниципальные служащие);
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу;
- лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;
- *лица, работающие в организация птицеводства и свиноводства, сотрудники зоопарков, имеющие контакт с птицей/свиньями, лица, осуществляющие разведение домашней птицы и свиней.*

Медицинские организации

Годовой план профилактических прививок медицинской организации

Территориальные органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Сроки: декабрь – январь

ПЛАН ПРИВИВОК - утверждается приказом Руководителем МО

Орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья

Сводный годовой план профилактических прививок субъекта РФ (в разрезе муниципальных образований)

Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте РФ

Сроки: до 1 февраля

ПЛАН ПРИВИВОК - утверждается приказом Органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья

Форма 6 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний»

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТИНГЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВАКЦИНАЦИИ:

КВ= Ч- П- В и/или РВ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **КВ - контингенты, подлежащие вакцинации в соответствии с НКПП;**
- **Ч - численность контингента возрастной группы, подлежащей иммунизации в соответствии с НКПП (форма 6 – графа состоит на учете);**
- **П - переболевшие (форма 6 графы – переболело);**
- **В или РВ – получившие вакцинацию или ревакцинацию в соответствии с НКПП (форма 6 графы – вакцинировано, ревакцинировано)**

1. КОНТИНГЕНТЫ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ Н
(000)

Возраст	№ стро-ки	Состоит на учете
1	2	3
- 11 месяцев 29 дней	1	361
том числе: 6 мес. - 11 мес. 29 дней	2	194
год - 1г. 11 месяцев 29 дней	3	391
года - 2 г. 11 месяцев 29 дней	4	363
года - 3 г. 11 месяцев 29 дней	5	421
года - 4 г. 11 месяцев 29 дней	6	437
лет - 5 лет 11 месяцев 29 дней	7	484
лет - 6 лет 11 месяцев 29 дней	8	563
ет - 7 лет 11 месяцев 29 дней	9	567
лет - 8 лет 11 месяцев 29 дней	10	580
лет - 9 лет 11 месяцев 29 дней	11	597
лет - 10 лет 11 месяцев 29 дней	12	574
лет - 11 лет 11 месяцев 29 дней	13	499
лет - 12 лет 11 месяцев 29 дней	14	588
лет - 13 лет 11 месяцев 29 дней	15	580
лет - 14 лет 11 месяцев 29 дней	16	612
лет - 15 лет 11 месяцев 29 дней	17	518
лет - 16 лет 11 месяцев 29 дней	18	477
лет - 17 лет 11 месяцев 29 дней	19	428
лет - 35 лет 11 месяцев 29 дней	20	9854
лет - 59 лет 11 месяцев 29 дней	21	19108
лет и старше - всего *	22	10465
том числе: раждане старше трудоспособного озраста из групп риска, проживающих в рганизациях социального обслуживания	23	389

Возраст	№ стро-ки	переболело корью		привито против кори	
		всего	в том числе привитых	вакцини-ровано	ревакци-нировано
1	2	18	19	20	21
0 - 11 месяцев 29 дней	1	0	X	X	X
в том числе: 6 мес. - 11 мес. 29 дней	2	0	X	X	X
1 год - 1г. 11 месяцев 29 дней	3	0	0	391	X
2 года - 2 г. 11 месяцев 29 дней	4	0	0	363	X
3 года - 3 г. 11 месяцев 29 дней	5	0	0	421	X
4 года - 4 г. 11 месяцев 29 дней	6	0	0	437	X
5 лет - 5 лет 11 месяцев 29 дней	7	0	0	483	0
6 лет - 6 лет 11 месяцев 29 дней	8	0	0	3	560
7лет - 7 лет 11 месяцев 29 дней	9	0	0	3	563
8 лет - 8 лет 11 месяцев 29 дней	10	0	0	0	580
9 лет - 9 лет 11 месяцев 29 дней	11	0	0	0	597
10 лет - 10 лет 11 месяцев 29 дней	12	0	0	0	573
11 лет - 11 лет 11 месяцев 29 дней	13	0	0	0	499
12 лет - 12 лет 11 месяцев 29 дней	14	0	0	0	588
13 лет - 13 лет 11 месяцев 29 дней	15	0	0	0	580
14 лет - 14 лет 11 месяцев 29 дней	16	0	0	0	612
15 лет - 15 лет 11 месяцев 29 дней	17	0	0	0	517
16 лет - 16 лет 11 месяцев 29 дней	18	0	0	0	476
17 лет - 17 лет 11 месяцев 29 дней	19	0	0	0	428
18 лет - 35 лет 11 месяцев 29 дней	20	0	0	29	9800
36 лет - 59 лет 11 месяцев 29 дней	21	0	0	455	18588
60 лет и старше - всего *	22	0	0	22	8781
в том числе: граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	23	X	X	X	X

План вакцинации против кори детей до 17 лет
(возрастная группа **от 0 до 17лет 11 мес.29 дней)**:

КВ = 9234 (Ч - графа 3) – 0 (П - графа 18) – 2101 (В - графа 20) – 6573 (РВ - графа 21 = 560

План вакцинации против кори взрослых 18-35 лет
(возрастная группа 18-35 лет 11 мес.29 дней):

КВ = 9853 (Ч - графа 3) – 0 (П - графа 18) – 29 (В - графа 20) – 9800 (РВ - графа 21) = 24

Форма 6 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний»

РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТИНГЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕВАКЦИНАЦИИ:

КРВ = В и/или РВ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- **КРВ - контингенты, подлежащие ревакцинации в соответствии с НКПП;**
- **П - переболевшие (форма 6 графы – переболело);**
- **В или РВ – получившие вакцинацию или ревакцинацию в соответствии с НКПП (форма 6 графы – вакцинировано, ревакцинировано)**

1. КОНТИНГЕНТЫ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ Н
000)

Возраст	№ стро-ки	Состоит на учете
1	2	3
- 11 месяцев 29 дней	1	361
том числе: 6 мес. - 11 мес. 29 дней	2	194
год - 1г. 11 месяцев 29 дней	3	391
года - 2 г. 11 месяцев 29 дней	4	363
года - 3 г. 11 месяцев 29 дней	5	421
года - 4 г. 11 месяцев 29 дней	6	437
лет - 5 лет 11 месяцев 29 дней	7	484
лет - 6 лет 11 месяцев 29 дней	8	563
ет - 7 лет 11 месяцев 29 дней	9	567
лет - 8 лет 11 месяцев 29 дней	10	580
лет - 9 лет 11 месяцев 29 дней	11	597
лет - 10 лет 11 месяцев 29 дней	12	574
лет - 11 лет 11 месяцев 29 дней	13	499
лет - 12 лет 11 месяцев 29 дней	14	588
лет - 13 лет 11 месяцев 29 дней	15	580
лет - 14 лет 11 месяцев 29 дней	16	612
лет - 15 лет 11 месяцев 29 дней	17	518
лет - 16 лет 11 месяцев 29 дней	18	477
лет - 17 лет 11 месяцев 29 дней	19	428
лет - 35 лет 11 месяцев 29 дней	20	9854
лет - 59 лет 11 месяцев 29 дней	21	19108
лет и старше - всего *	22	10465
том числе: раждане старше трудоспособного зраста из групп риска, проживающих в рганизациях социального обслуживания	23	389

Возраст	№ стро-ки	переболело корью		привито против кори	
		всего	в том числе привитых	вакцини-ровано	ревакци-нировано
1	2	18	19	20	21
0 - 11 месяцев 29 дней	1	0	X	X	X
в том числе: 6 мес. - 11 мес. 29 дней	2	0	X	X	X
1 год - 1г. 11 месяцев 29 дней	3	0	0	391	X
2 года - 2 г. 11 месяцев 29 дней	4	0	0	363	X
3 года - 3 г. 11 месяцев 29 дней	5	0	0	421	X
4 года - 4 г. 11 месяцев 29 дней	6	0	0	437	X
5 лет - 5 лет 11 месяцев 29 дней	7	0	0	483	0
6 лет - 6 лет 11 месяцев 29 дней	8	0	0	3	560
7лет - 7 лет 11 месяцев 29 дней	9	0	0	3	563
8 лет - 8 лет 11 месяцев 29 дней	10	0	0	0	580
9 лет - 9 лет 11 месяцев 29 дней	11	0	0	0	597
10 лет - 10 лет 11 месяцев 29 дней	12	0	0	0	573
11 лет - 11 лет 11 месяцев 29 дней	13	0	0	0	499
12 лет - 12 лет 11 месяцев 29 дней	14	0	0	0	588
13 лет - 13 лет 11 месяцев 29 дней	15	0	0	0	580
14 лет - 14 лет 11 месяцев 29 дней	16	0	0	0	612
15 лет - 15 лет 11 месяцев 29 дней	17	0	0	0	517
16 лет - 16 лет 11 месяцев 29 дней	18	0	0	0	476
17 лет - 17 лет 11 месяцев 29 дней	19	0	0	0	428
18 лет - 35 лет 11 месяцев 29 дней	20	0	0	29	9800
36 лет - 59 лет 11 месяцев 29 дней	21	0	0	455	18588
60 лет и старше - всего *	22	0	0	22	8781
в том числе: граждане старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	23	X	X	X	X

Страница

План ревакцинации против кори детей до 17 лет (возрастная группа возрастная группа **от 5 до 17лет 11 мес.29 дней)**:

КРВ = 489 (В - графа 20) = 489

План ревакцинации против кори взрослых 18-35 лет (возрастная группа 18-35 лет 11 мес.29 дней):

КРВ = 29 (В - графа 20) = 29